

**КОМПИР И РЕПА**

МАКЕДОНИЈА

# КОМПИР

Посаден 20.04.2009



# Ралика




- Пред берба лисната маса кај 4, 5, 6 пати третираните, беше поголема и потемно зелена, заради антиоксидативното делување на Herbagreen
- Не беа нападнати од пламеница , а компировата златица едноставно не беше заинтересирана за него

# СОБИРАЊЕ И МЕРЕЊЕ



# МЕРЕЊЕ





# ЗАКЛУЧОК

- Стеблата на компирот беа поголеми и поразгранети кај оние со поголем број третмани, а најизразен раст имаа оние кои беа 6х третмани
- Листот е со изразена зелена боја , подебел и поголем. Заради одличната виталност и зголемената фотосинтеза не страдаа од заболувања , останаа долго физиолошки активни, а компировата златица ги избегнуваше
- Плодовите (кртоли) – со зголемен број третирања, растеше нивната маса, а исто така и нивниот број резултира на заклучокт дека третирањето е рентабилно

# РЕПА

08.07.2009.

Посадена почеток на 5 месец




Број на третирања



# ВИТАЛИЗАЦИЈА

17.08.2009





# ЗАКЛУЧОК

- Заради елементарните непогоди, сушата и големите температури, лисната маса на нетретирани билки дехидрираа и се сушеа
- Билките третирани 3 и повеќе пати со Herbagreen, останаа со голема асимилациска површина, благодарение на антиоксиданското својство кое ја овозможи непрекинатата работа на фотосинтезата
- Коренот, односно плодовите, од веќе наведеното предходно, можеа нормално да се развијат, така што на крајот беа многу поголеми и поздравии