

МЛАДО ЛОЗЈЕ

МАКЕДОНИЈА

ПОСАДЕНИ БРАЗДИ

07.05.2009.



08.05.2009.



ОПШТИ ПОДАТОЦИ

- **Браздите посадени на 29.04.2007.**
- Столбовите поставени на 08. – 12.05.2007.
- Столбовите се од PVC
- Столбовите од PVC се отпорни на влијанието на температурата и атмосферата
- Видливо е дека се применувала геометрија во граница на нормала и покрај разделеност на теренот
- Младото лозје се наоѓа непосредно покрај старото, па можноста за пренос на болести е поголема

I-ви ТРЕТМАН

10.06.2009.



ПОЧЕТОК НА ТРЕТИРАЊЕ

- Прво третирање е изведено на 08.06.2007
- Насадот веќе има доволно лисна маса за прво третирање со Herbagreen, кој воедно служи и како превентивна заштита
- Заради нежниот епидерм на листот и младите клетки, првото третирање е изведено со 0,3%раствор

III-ти ТРЕТМАН

04.07.2009.



нетретирано

ПОСЛЕ III-то ТРЕТИРАЊЕ

- Видлив е значителен напредок и развој на билките во секој поглед
- Растот и развојот на листот е очигледен, а изразитата боја е од повеќе хлорофил што е знак колку интензивно се одвива процесот на фотосинтеза во тие листови , и колку е лозата физиолошки силна и активна

ДЕТАЛ-ЛИСТ



V-ти ТРЕТМАН

30.07.2009



ПРВИ ПЛОДОВИ

25.08.2009.



↑
Испукана земја од суша

VII –ми ТРЕТМАН

СКРАТЕНА ЛОЗА

30.08.2009.



29.04. – 15.09.2009.



08.05.2009



15.09.2009

ЗАКЛУЧОК

- После 4,5 месеци и VII-от третман со Herbagreen, сликите говорат се.
- Лозата е здрава и е во супер кондиција, полека се припрема за зима .
- Листовите се големи, со изразито темно зелена боја со многу хлорофил, зголемена фотосинтеза и намалена транспирација .
- Лозата исто така е со изразито темно зелена боја, цврста и голема.
- Кога на другите места процентот на примање беше 40 – 50% па и помалку, во оваа сушна година примени беа 99%.
- Прирастот на лозата во висина е преку 2,5m (потребно беше и прицврстување).