

ПИПЕРКА

МАКЕДОНИЈА

БЛАГИ ФЕФЕРОНИ

- Не се користени никакви синтетички минерални ѓубрива
- Расадот е посаден на 06.05.2009.
- По садењето цело лето долготрајна суша и екстремно високи температури
- Прво третирање 18.05.2009

РАЗЛИКА ПО ТРЕТИРАЊЕ

27.05.2009.



Поголеми билки
Поголеми и темно-
Зелени листови

ПОСЛЕ IV-от ТРЕТМАН

04.07.2009.



РАЗЛИКА

- Билките третирани четири пати создадоа значително голем број- поголеми и подебели изданоци кои се со потемно зелена боја
- Листовите се поголеми, побројни, подебели и потемно зелени заради поголемиот број на хлоропласти во нив
- Повеќе пати третираните цветаат, а веќе се јавуваат и првите плодови покрај сушата и екстремните температури

БЕРБА


14.08.2009



КОМЕНТАР

- Билките повеќе пати третирани имаат многу повеќе плодови
- Плодовите од повеќе пати третираните билки беа здрави , убави, и со еднаква големина, не паѓаа и покрај сушата, а и порано дозреваа од нетретираните

ТЕЖИНА



ПИПЕРКА-РОГ

Посадено 01.06.2009



0

I

II

III

ПОСЛЕ II-от ТРЕТМАН



ПОСЛЕ III-от ТРЕТМАН

03.08.2009



КОМЕНТАР

- Пиперката повеќе пати третирана со Herbagreen е поголема, со повеќе изданоци , подебела и со појако стебло
- Порано почнуваат да цветаат, плодовите порано се појавуваат и покрај сучата се здрави и големи и побројни
- Листовите се подебели, побројни, потемно зелени, како и целата билка во целина

ЗАКЛУЧОК

- Билките третирани со Herbagreen, се со темно зелените лисја и стебленца беа побујни заради зголемената фотосинтеза , дадоа многу поголем род од очекуваното кога ќе се земе во предвид сушата и екстремните температури кои беа присутни ова лето
- Плодовите беа поголеми, здрави и “меснати”, а вкусот многу подобар од нетретираниите , со тоа што веќе набраните можеа да стојат на сонце повеќе време и да изгледаат свежи како што туку набрани – значи време таењето на складирање битно е продолжено